

Cascada de Tratamiento del VIH en el Estado de Nueva York, 2023

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

112,300

Personas que viven con VIH diagnosticado

105,400

94% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado del VIH durante el año*

93,500

83% de las personas que viven con VIH
89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

85,300

75% de las personas que viven con VIH
80% de las personas que viven con VIH diagnosticado
91% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.1% estimación del Estado de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Ciudad de Nueva York, 2023

Residentes de la Ciudad de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

86,700

Personas que viven con VIH diagnosticado

81,900

95% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado del VIH durante el año*

72,500

84% de las personas que viven con VIH

88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

65,500

75% de las personas que viven con VIH

79% de las personas que viven con VIH diagnosticado

90% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (5.5% estimación de la ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York, 2023

Residentes del Estado de Nueva York, Sin Incluir la Ciudad de Nueva York†, a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

25,600

Personas que viven con VIH diagnosticado

23,500

92% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado del VIH durante el año*

21,100

82% de las personas que viven con VIH

90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

19,800

77% de las personas que viven con VIH

83% de las personas que viven con VIH diagnosticado

94% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Albany del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Albany del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH†

3,380

Personas que viven con VIH diagnosticado

3,110

92% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado del VIH durante el año*

2,830

84% de las personas que viven con VIH
91% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

2,690

79% de las personas que viven con VIH
86% de las personas que viven con VIH diagnosticado
95% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)


* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Binghamton del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Binghamton del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2023



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department
of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Buffalo del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Buffalo del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH†

3,300

Personas que viven con VIH diagnosticado

3,040

92% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado del VIH durante el año*

2,750

83% de las personas que viven con VIH
91% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

2,560

77% de las personas que viven con VIH
84% de las personas que viven con VIH diagnosticado
93% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Lower Hudson del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Lower Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

4,050

Personas que viven con VIH diagnosticado

3,730

92% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado del VIH durante el año*

3,300

81% de las personas que viven con VIH
89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

3,100

75% de las personas que viven con VIH
82% de las personas que viven con VIH diagnosticado
94% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Mid Hudson del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Mid Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH†

2,550

Personas que viven con VIH diagnosticado

2,350

92% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado del VIH durante el año*

2,060

81% de las personas que viven con VIH
88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

1,950

75% de las personas que viven con VIH
81% de las personas que viven con VIH diagnosticado
95% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

6,140

Personas que viven con VIH diagnosticado

5,650

92% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado del VIH durante el año*

5,050

82% de las personas que viven con VIH
89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

4,800

77% de las personas que viven con VIH
84% de las personas que viven con VIH diagnosticado
95% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Rochester del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Rochester del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

3,140

Personas que viven con VIH diagnosticado

2,890

92% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado del VIH durante el año*

2,610

83% de las personas que viven con VIH

90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

2,420

76% de las personas que viven con VIH

83% de las personas que viven con VIH diagnosticado

93% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Syracuse del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Syracuse del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH†

2,450

Personas que viven con VIH diagnosticado

2,260

92% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado del VIH durante el año*

2,030

83% de las personas que viven con VIH
90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

1,900

77% de las personas que viven con VIH
83% de las personas que viven con VIH diagnosticado
94% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Contacto Sexual Hombre con Hombre[§]

Residentes del Estado de Nueva York[†] a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH[‡]

62,900

Personas que viven con VIH diagnosticado

54,200

Recibió cuidado del VIH durante el año*

47,900

76% de las personas que viven con VIH
88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

44,000

69% de las personas que viven con VIH
80% de las personas que viven con VIH diagnosticado
92% de los casos con cualquier cuidado del VIH

[§] Incluye personas con riesgo de transmisión del VIH por contacto sexual de hombre a hombre y por contacto sexual de hombre a hombre + uso de drogas inyectables.

[†] Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

[‡] Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Uso de Drogas Inyectables[§]

Residentes del Estado de Nueva York[†] a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH[‡]

14,700

Personas que viven con VIH diagnosticado

13,500

Recibió cuidado del VIH durante el año*

12,400

84% de las personas que viven con VIH
92% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

10,800

73% de las personas que viven con VIH
79% de las personas que viven con VIH diagnosticado
87% de los casos con cualquier cuidado del VIH

[§] Incluye personas con uso de drogas inyectables y riesgo de transmisión del VIH por contacto sexual de hombre a hombre + uso de drogas inyectables.

[†] Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

[‡] Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.4% estimación de los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Contacto Heterosexual

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

33,200

Personas que viven con VIH diagnosticado

29,300

Recibió cuidado del VIH durante el año*

26,300

79% de las personas que viven con VIH
90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

24,000

71% de las personas que viven con VIH
81% de las personas que viven con VIH diagnosticado
92% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (12% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como de color y/o afroamericanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

52,900

Personas que viven con VIH diagnosticado

46,400

Recibió cuidado del VIH durante el año*

41,100

78% de las personas que viven con VIH
89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

36,300

68% de las personas que viven con VIH
77% de las personas que viven con VIH diagnosticado
88% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (12.4% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como hispanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

37,600

Personas que viven con VIH diagnosticado

31,600

Recibió cuidado del VIH durante el año*

28,300

75% de las personas que viven con VIH
89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

26,000

68% de las personas que viven con VIH
81% de las personas que viven con VIH diagnosticado
92% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (16% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como blancas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

26,400

Personas que viven con VIH diagnosticado

23,500

Recibió cuidado del VIH durante el año*

20,800

79% de las personas que viven con VIH
88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

19,800

74% de las personas que viven con VIH
83% de las personas que viven con VIH diagnosticado
96% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (10.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como multirraza

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

720

Personas que viven con VIH diagnosticado

640

Recibió cuidado del VIH durante el año*

550

76% de las personas que viven con VIH
86% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

490


68% de las personas que viven con VIH
76% de las personas que viven con VIH diagnosticado
90% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (11.3% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como nativas americanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (22.9% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como asiáticas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

3,030

Personas que viven con VIH diagnosticado

2,810

Recibió cuidado del VIH durante el año*

2,410

80% de las personas que viven con VIH
86% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

2,330

76% de las personas que viven con VIH
82% de las personas que viven con VIH diagnosticado
97% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.3% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como nativos hawaianos / isleños del Pacífico

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

150

Personas que viven con VIH diagnosticado

120

Recibió cuidado del VIH durante el año*

104

71% de las personas que viven con VIH
88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

97

65% de las personas que viven con VIH
81% de las personas que viven con VIH diagnosticado
93% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (19.3% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres[§]

Residentes del Estado de Nueva York[†] a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH[‡]

89,000

Personas que viven con VIH diagnosticado

76,900

Recibió cuidado del VIH durante el año*

67,800

76% de las personas que viven con VIH
88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

61,900

69% de las personas que viven con VIH
80% de las personas que viven con VIH diagnosticado
91% de los casos con cualquier cuidado del VIH

[§] Sexo asignado al nacer

[†] Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

[‡] Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.6% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres Cisgenero §

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

85,800

Personas que viven con VIH diagnosticado

74,100

Recibió cuidado del VIH durante el año*

65,300

76% de las personas que viven con VIH
88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

59,900

69% de las personas que viven con VIH
80% de las personas que viven con VIH diagnosticado
92% de los casos con cualquier cuidado del VIH

§ Personas cuyo género actual es el mismo que su sexo asignado al nacer

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.6% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres[§]

Residentes del estado de Nueva York[†] a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH[‡]

31,700

Personas que viven con VIH diagnosticado

28,600

Recibió cuidado del VIH durante el año*

25,800

81% de las personas que viven con VIH
90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

23,400

73% de las personas que viven con VIH
81% de las personas que viven con VIH diagnosticado
91% de los casos con cualquier cuidado del VIH

[§] Sexo asignado al nacer

[†] Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

[‡] Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (9.9% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres Cisgenero §

Residentes del estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

31,600

Personas que viven con VIH diagnosticado

28,500

Recibió cuidado del VIH durante el año*

25,700

81% de las personas que viven con VIH
90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

23,300

73% de las personas que viven con VIH
81% de las personas que viven con VIH diagnosticado
91% de los casos con cualquier cuidado del VIH

§ Personas cuyo género actual es el mismo que su sexo asignado al nacer

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (9.9% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Las personas transgénero y las personas de género no conforme o género no binario[§]

Residentes del Estado de Nueva York[†] a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH[‡]

3,050

Personas que viven con VIH diagnosticado

2,860

Recibió cuidado del VIH durante el año*

2,540

84% de las personas que viven con VIH
89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

2,160

70% de las personas que viven con VIH
75% de las personas que viven con VIH diagnosticado
85% de los casos con cualquier cuidado del VIH

[§] Incluye Hombre transgénero, Mujer transgénero y personas de género no conforme o género no binario

[†] Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

[‡] Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.1% estimación del Estado de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Jóvenes (personas entre 13 a 24 años de edad)

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven
con VIH‡

3,420

Personas que viven con VIH
diagnosticado

1,930

Recibió cuidado del VIH durante
el año*

1,680

49% de las personas que viven con VIH
87% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no
detectable o <200 copias por
mililitro de sangre) en la prueba
más cercana a fin de año

1,460

42% de las personas que viven con VIH
75% de las personas que viven con VIH diagnosticado
87% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (43.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Adultos Mayores de 50 años

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH‡

62,000

Personas que viven con VIH diagnosticado

59,700

Recibió cuidado del VIH durante el año*

54,600

88% de las personas que viven con VIH
91% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

50,800

81% de las personas que viven con VIH
84% de las personas que viven con VIH diagnosticado
93% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
‡ Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (3.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para personas mayores de 55 años de edad)
* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres Pertencientes a Minorías[§]

Residentes del Estado de Nueva York[†] a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH[‡]

65,600

Personas que viven con VIH diagnosticado

56,700

Recibió cuidado del VIH durante el año*

50,000

76% de las personas que viven con VIH
88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

44,900

68% de las personas que viven con VIH
78% de las personas que viven con VIH diagnosticado
90% de los casos con cualquier cuidado del VIH

[§] Incluye a hombres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.

[†] Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

[‡] Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.6% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para varones)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres Pertencientes a Minorías[§]

Residentes del Estado de Nueva York[†] a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH[‡]

27,900

Personas que viven con VIH diagnosticado

25,200

Recibió cuidado del VIH durante el año*

22,700

81% de las personas que viven con VIH
90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

20,500

73% de las personas que viven con VIH
81% de las personas que viven con VIH diagnosticado
90% de los casos con cualquier cuidado del VIH

[§] Incluye a mujeres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancas no hispanas.

[†] Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

[‡] Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (9.9% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para mujeres)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Antecedentes de Contacto Sexual Hombre con Hombre Entre Personas de Color[§]

Residentes del Estado de Nueva York[†] a Fines del 2023

Personas estimadas que viven con VIH[‡]

43,300

Personas que viven con VIH diagnosticado

37,400

Recibió cuidado del VIH durante el año*

33,000

76% de las personas que viven con VIH
88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Casos con supresión viral (no detectable o <200 copias por mililitro de sangre) en la prueba más cercana a fin de año

29,700

68% de las personas que viven con VIH
79% de las personas que viven con VIH diagnosticado
90% de los casos con cualquier cuidado del VIH

[§] Incluye personas con contacto sexual de hombre a hombre y contacto sexual de hombre a hombre + uso de drogas inyectables. Riesgos de transmisión del VIH de todos los grupos raciales o étnicos, excepto los blancos no hispanos.

[†] Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

[‡] Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.6% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para contacto sexual de hombre a hombre y contacto sexual de hombre a hombre + uso de drogas inyectables)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health