

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH EN EL ESTADO DE NUEVA YORK, 2024

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 114,700

93% de las personas que viven con VIH

Personas que viven con VIH diagnosticado², 106,800

Recibió cuidado³, 95,300

83% de las personas que viven con VIH

89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 87,600

76% de las personas que viven con VIH

81% de las personas que viven con VIH diagnosticado

92% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: CIUDAD DE NUEVA YORK, 2024

Residentes de la Ciudad de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 88,800

93% de las personas que viven con VIH

Personas que viven con VIH diagnosticado², 82,900

Recibió cuidado³, 73,900

83% de las personas que viven con VIH

89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 67,300

75% de las personas que viven con VIH

80% de las personas que viven con VIH diagnosticado

91% de los casos con cualquier cuidado del VIH



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.7% estimación del estado de Nueva York utilizando datos de la ciudad de Nueva York).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: ESTADO DE NUEVA YORK SIN INCLUIR LA CIUDAD DE NUEVA YORK, 2024

Residentes del Estado de Nueva York, sin incluir la Ciudad de Nueva York, a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 25,900

92% de las personas que viven con VIH

Personas que viven con VIH diagnosticado², 23,900

82% de las personas que viven con VIH

90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Recibió cuidado³, 21,400

77% de las personas que viven con VIH

84% de las personas que viven con VIH diagnosticado

95% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Suprimido viralmente⁴, 20,300

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos del resto del estado).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: REGIÓN DE ALBANY DEL PROGRAMA RYAN WHITE

Residentes de la región de Albany del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 3,380

92% de las personas que viven con VIH

Personas que viven con VIH diagnosticado², 3,110

85% de las personas que viven con VIH
92% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Recibió cuidado³, 2,860

79% de las personas que viven con VIH
86% de las personas que viven con VIH diagnosticado
95% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Suprimido viralmente⁴, 2,700

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos del resto del estado).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: REGIÓN DE BINGHAMTON DEL PROGRAMA RYAN WHITE

Residentes de la región de Binghamton del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 580

92% de las personas que viven con VIH

Personas que viven con VIH diagnosticado², 530

Recibió cuidado³, 470

81% de las personas que viven con VIH

88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 420

73% de las personas que viven con VIH

79% de las personas que viven con VIH diagnosticado

91% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos del resto del estado).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: REGIÓN DE BUFFALO DEL PROGRAMA RYAN WHITE

Residentes de la región de Buffalo del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 3,290

92% de las personas que viven con VIH

Personas que viven con VIH diagnosticado², 3,030

Recibió cuidado³, 2,680

81% de las personas que viven con VIH

88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 2,490

75% de las personas que viven con VIH

81% de las personas que viven con VIH diagnosticado

93% de los casos con cualquier cuidado del VIH



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos del resto del estado).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: REGIÓN DE LOWER HUDSON DEL PROGRAMA RYAN WHITE

Residentes de la región de Lower Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 4,110

92% de las personas que viven con VIH

Personas que viven con VIH diagnosticado², 3,790

Recibió cuidado³, 3,360

82% de las personas que viven con VIH

89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 3,200

77% de las personas que viven con VIH

83% de las personas que viven con VIH diagnosticado

95% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos del resto del estado).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: REGIÓN DE MID HUDSON DEL PROGRAMA RYAN WHITE

Residentes de la región de Mid Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 2,590

92% de las personas que viven con VIH

Personas que viven con VIH diagnosticado², 2,380

Recibió cuidado³, 2,080

80% de las personas que viven con VIH
87% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 1,980

74% de las personas que viven con VIH
80% de las personas que viven con VIH diagnosticado
95% de los casos con cualquier cuidado del VIH



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos del resto del estado).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: REGIÓN DE NASSAU-SUFFOLK DEL PROGRAMA RYAN WHITE

Residentes de la región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 6,280

92% de las personas que viven con VIH

Personas que viven con VIH diagnosticado², 5,790

Recibió cuidado³, 5,210

83% de las personas que viven con VIH

90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 5,010

79% de las personas que viven con VIH

85% de las personas que viven con VIH diagnosticado

96% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos del resto del estado).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: REGIÓN DE ROCHESTER DEL PROGRAMA RYAN WHITE

Residentes de la región de Rochester del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 3,200

Personas que viven con VIH diagnosticado², 2,950

92% de las personas que viven con VIH

Recibió cuidado³, 2,670

83% de las personas que viven con VIH

90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 2,500

77% de las personas que viven con VIH

84% de las personas que viven con VIH diagnosticado

94% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos del resto del estado).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: REGIÓN DE SYRACUSE DEL PROGRAMA RYAN WHITE

Residentes de la región de Syracuse del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 2,520

92% de las personas que viven con VIH

Personas que viven con VIH diagnosticado², 2,320

Recibió cuidado³, 2,090

83% de las personas que viven con VIH

90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 1,970

77% de las personas que viven con VIH

84% de las personas que viven con VIH diagnosticado

94% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos del resto del estado).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: PERSONAS CON ANTECEDENTES DE CONTACTO SEXUAL HOMBRE CON HOMBRE*

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 60,600

Personas que viven con VIH diagnosticado², 55,600

Recibió cuidado³, 49,500

82% de las personas que viven con VIH

89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 45,700

75% de las personas que viven con VIH

81% de las personas que viven con VIH diagnosticado

92% de los casos con cualquier cuidado del VIH



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York. *Incluye personas con riesgo de transmisión del VIH por contacto sexual de hombre a hombre y por contacto sexual de hombre a hombre + uso de drogas inyectables.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.2% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: PERSONAS CON ANTECEDENTES DE USO DE DROGAS INYECTABLES*

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 13,300

Personas que viven con VIH diagnosticado², 13,000

Recibió cuidado³, 12,000

90% de las personas que viven con VIH

92% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 10,600

78% de las personas que viven con VIH

81% de las personas que viven con VIH diagnosticado

88% de los casos con cualquier cuidado del VIH



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York. *Incluye personas con uso de drogas inyectables y riesgo de transmisión del VIH por contacto sexual de hombre a hombre + uso de drogas inyectables.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (2.7% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: PERSONAS CON ANTECEDENTES DE CONTACTO HETEROSEXUAL

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 31,300

Personas que viven con VIH diagnosticado², 29,300

Recibió cuidado³, 26,400

84% de las personas que viven con VIH
90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 24,400

77% de las personas que viven con VIH
82% de las personas que viven con VIH diagnosticado
92% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.4% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



**Department
of Health**

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: PERSONAS QUE SE IDENTIFICAN COMO DE COLOR Y/O AFROAMERICANAS

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 50,200

Personas que viven con VIH diagnosticado², 46,700

Recibió cuidado³, 41,600

83% de las personas que viven con VIH

89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 37,100

73% de las personas que viven con VIH

79% de las personas que viven con VIH diagnosticado

89% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



**Department
of Health**

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: PERSONAS QUE SE IDENTIFICAN COMO HISPANAS

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 35,300

Personas que viven con VIH diagnosticado², 32,600

Recibió cuidado³, 29,300

83% de las personas que viven con VIH

90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 27,100

76% de las personas que viven con VIH

82% de las personas que viven con VIH diagnosticado

92% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.6% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: PERSONAS QUE SE IDENTIFICAN COMO BLANCAS

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 24,600

Personas que viven con VIH diagnosticado², 23,300

Recibió cuidado³, 20,800

84% de las personas que viven con VIH
89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 19,900

80% de las personas que viven con VIH
84% de las personas que viven con VIH diagnosticado
96% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (5.3% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: PERSONAS QUE SE IDENTIFICAN COMO MULTIRAZA

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 750

Personas que viven con VIH diagnosticado², 710

Recibió cuidado³, 620

82% de las personas que viven con VIH

88% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 550

73% de las personas que viven con VIH

78% de las personas que viven con VIH diagnosticado

89% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.3% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: PERSONAS QUE SE IDENTIFICAN COMO NATIVAS AMERICANAS

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 210

Personas que viven con VIH diagnosticado², 200

Recibió cuidado³, 170

83% de las personas que viven con VIH

87% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 160

75% de las personas que viven con VIH

79% de las personas que viven con VIH diagnosticado

92% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (4.8% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: PERSONAS QUE SE IDENTIFICAN COMO ASIÁTICAS

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 3,250

Personas que viven con VIH diagnosticado², 2,960

Recibió cuidado³, 2,590

80% de las personas que viven con VIH

87% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 2,500

76% de las personas que viven con VIH

83% de las personas que viven con VIH diagnosticado

96% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: PERSONAS QUE SE IDENTIFICAN COMO NATIVOS HAWAIANOS / ISLEÑOS DEL PACÍFICO

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 140

Personas que viven con VIH diagnosticado², 120

Recibió cuidado³, 100

69% de las personas que viven con VIH

85% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 97

67% de las personas que viven con VIH

82% de las personas que viven con VIH diagnosticado

97% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (18.5% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



**Department
of Health**

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: HOMBRES*

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 84,600

Personas que viven con VIH diagnosticado², 78,200

Recibió cuidado³, 69,500

82% de las personas que viven con VIH

89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 63,800

75% de las personas que viven con VIH

81% de las personas que viven con VIH diagnosticado

92% de los casos con cualquier cuidado del VIH



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York. *Sexo asignado al nacer

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.5% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: HOMBRES CISGENERO*

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 81,300

Personas que viven con VIH diagnosticado², 75,200

Recibió cuidado³, 66,800

82% de las personas que viven con VIH

89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 61,500

75% de las personas que viven con VIH

81% de las personas que viven con VIH diagnosticado

92% de los casos con cualquier cuidado del VIH



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York. *Personas cuyo género actual es el mismo que su sexo asignado al nacer.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.5% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: MUJERES*

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 30,100

Personas que viven con VIH diagnosticado², 28,500

Recibió cuidado³, 25,900

86% de las personas que viven con VIH

91% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 23,700

78% de las personas que viven con VIH

82% de las personas que viven con VIH diagnosticado

92% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York. *Sexo asignado al nacer.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (5.3% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



**Department
of Health**

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: MUJERES CISGENERO*

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 30,000

Personas que viven con VIH diagnosticado², 28,400

Recibió cuidado³, 25,800

86% de las personas que viven con VIH

91% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 23,700

78% de las personas que viven con VIH

82% de las personas que viven con VIH diagnosticado

92% de los casos con cualquier cuidado del VIH



**Department
of Health**

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York. *Personas cuyo género actual es el mismo que su sexo asignado al nacer.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (5.3% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: LAS PERSONAS TRANSGÉNERO Y LAS PERSONAS DE GENERO NO CONFORME O GENERO NO BINARIO*

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 3,360

Personas que viven con VIH diagnosticado², 3,130

Recibió cuidado³, 2,800

83% de las personas que viven con VIH

90% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 2,400

71% de las personas que viven con VIH

76% de las personas que viven con VIH diagnosticado

86% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York. *Incluye Hombre transgénero, Mujer transgénero y personas de género no conforme o género no binario.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.


⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: JÓVENES (PERSONAS ENTRE 13 A 24 AÑOS DE EDAD)

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (30.9% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.



Department
of Health

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: ADULTOS MAYORES DE 50 AÑOS

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 61,200

Personas que viven con VIH diagnosticado², 59,900

Recibió cuidado³, 55,000

90% de las personas que viven con VIH

92% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 51,400

83% de las personas que viven con VIH

85% de las personas que viven con VIH diagnosticado

93% de los casos con cualquier cuidado del VIH

Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (2.2% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales de personas de 55 años o más).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: HOMBRES PERTENECIENTES A MINORÍAS*

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 62,900

Personas que viven con VIH diagnosticado², 58,200

Recibió cuidado³, 51,600

82% de las personas que viven con VIH

89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 46,700

73% de las personas que viven con VIH

79% de las personas que viven con VIH diagnosticado

90% de los casos con cualquier cuidado del VIH



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York. *Incluye a hombres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.5% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales de hombres).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: MUJERES PERTENECIENTES A MINORÍAS*

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 26,600

Personas que viven con VIH diagnosticado², 25,200

Recibió cuidado³, 22,900

86% de las personas que viven con VIH

91% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 20,900

78% de las personas que viven con VIH

82% de las personas que viven con VIH diagnosticado

91% de los casos con cualquier cuidado del VIH



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York. *Incluye a mujeres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancas no hispanas.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (5.3% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales de mujeres).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.

CASCADA DE TRATAMIENTO DEL VIH: ANTECEDENTES DE CONTACTO SEXUAL HOMBRE CON HOMBRE ENTRE PERSONAS DE COLOR*

Residentes del Estado de Nueva York a fines del 2024

Personas estimadas que viven con VIH¹, 42,400

Personas que viven con VIH diagnosticado², 38,900

Recibió cuidado³, 34,600

82% de las personas que viven con VIH

89% de las personas que viven con VIH diagnosticado

Suprimido viralmente⁴, 31,300

73% de las personas que viven con VIH

80% de las personas que viven con VIH diagnosticado

91% de los casos con cualquier cuidado del VIH



Datos a Junio de 2025, Registro de VIH del Estado de Nueva York. *Incluye personas con contacto sexual de hombre a hombre y contacto sexual de hombre a hombre + uso de drogas inyectables. Riesgos de transmisión del VIH de todos los grupos raciales o étnicos, excepto los blancos no hispanos.

¹Personas que viven con VIH diagnosticado y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.2% estimación del estado de Nueva York utilizando datos estatales de contacto sexual entre hombres y contacto sexual entre hombres + uso de drogas inyectables).

²Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

³Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año.

⁴La última prueba de carga viral reportada en el año calendario fue no detectable o <200 copias por mililitro de sangre.