

العام الدراسي 2025-2026

متطلبات التطعيم بولاية نيويورك للالتحاق بالمدرسة/ المداومة بها¹

ملاحظات:

يجب تطعيم جميع الأطفال بشكل مناسب لأعمارهم حتى يتمكنوا من المداومة في المدرسة في ولاية نيويورك. يستند عدد الجرعات إلى الجدول الزمني الذي أوصت به اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP). يجب أن تكون الفواصل الزمنية بين جرعات اللقاح متوافقة مع "الجدول الزمني لتطعيم الأطفال والمراهقين الذي أوصت به ACIP" (ACIP-Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule). الجرعات التي يتم تلقيها قبل الحد الأدنى للعمر أو الفواصل الزمنية الموضحة في الجدول ليست صالحة ولا يتم احتسابها ضمن عدد الجرعات المذكورة أدناه. راجع الملاحظات الهامشية للحصول على معلومات محددة لكل لقاح. يجب على الأطفال المسجلين في فصول غير صيفية استيفاء متطلبات التحصين الخاصة بالصفوف التي تعادل أعمارهم.

يجب قراءة متطلبات الجرعة مع هوامش هذا الجدول

الصف 12	الصفوف 6 و7 و8 و9 و10 و11	صف الروضة والصفوف 1 و2 و3 و4 و5	مرحلة ما قبل الروضة (الرعاية النهارية، برنامج (Head Start)، الحضانة أو صف ما قبل الروضة)	اللقاحات
3 جرعات	5 جرعات أو 4 جرعات إذا تم تلقي الجرعة الرابعة في سن 4 سنوات أو أكثر وبدأت سلسلة التطعيم في عمر أقل من عام واحد أو 3 جرعات إذا كان العمر 7 سنوات أو أكثر وبدأت سلسلة التطعيم في عمر سنة واحدة أو أكثر	4 جرعات	لقاح يحتوي على ذيفان الخناق والتيتانوس و لقاح السعال الديكي (DTaP/DTP/Tdap/Td) ²	
جرعة واحدة يُعطى بعد سن 10 سنوات	لا ينطبق		لقاح المراهقين المعزز الذي يحتوي على ذيفان التيتانوس والخناق و لقاح السعال الديكي (Tdap) ³	
4 جرعات أو 3 جرعات إذا تم تلقي الجرعة الثالثة في سن 4 سنوات أو أكثر		3 جرعات	لقاح شلل الأطفال (لقاح شلل الأطفال المعطل IPV/لقاح شلل الأطفال الفموي OPV) ⁴	
جرعتان		جرعة واحدة	لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) ⁵	
3 جرعات أو جرعتان من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب لدى البالغين (Recombivax) للأطفال الذين تلقوا الجرعات مع فاصل لمدة 4 أشهر على الأقل وبين سن 11 و15 سنة.		3 جرعات	لقاح التهاب الكبد الوبائي ب ⁶	
جرعتان		جرعة واحدة	لقاح جذري الماء (الحماق) ⁷	
الصف 12: جرعتان أو جرعة واحدة إذا تم تلقي الجرعة في سن 16 سنة أو أكثر	الصفوف 7 و8 و9 و10 و11: جرعة واحدة	لا ينطبق	لقاح المكورات السحائية المترافق (MenACWY) ⁸	
لا ينطبق		من جرعة واحدة إلى 4 جرعات	لقاح المستدمية النزلية من النوع ب (Hib) المترافق ⁹	
لا ينطبق		من جرعة واحدة إلى 4 جرعات	لقاح المكورات الرئوية المترافق (PCV) ¹⁰	

1. إن الأدلة المصلية المثبتة على وجود أجسام مضادة للحصبة أو النكاف أو الحصبة الألمانية أو التاكيد المختبري لهذه الأمراض هو دليل مقبول على المناعة ضد هذه الأمراض. تعتبر الاختبارات المصلية لشلل الأطفال دليلًا مقبولًا على المناعة إذا تم إجراء الاختبار قبل 1 سبتمبر/ أيلول 2019، وكانت جميع الأنماط المصلية الثلاثة إيجابية فقط. يُعد اختبار الدم الإيجابي للأجسام المضادة السطحية لالتهاب الكبد الوبائي ب دليلًا مقبولًا على المناعة ضد التهاب الكبد الوبائي ب. ويُعد الدليل المصلي المثبت على وجود أجسام مضادة لجذري الماء، أو التاكيد المختبري لمرض جذري الماء أو التشخيص من قِبل طبيب أو مساعد طبيب أو ممرض ممارس بأن الطفل قد أصيب بمرض جذري الماء دليلًا مقبولًا على المناعة ضد جذري الماء.

* لا يتم قبول العبارات المصلية أبدًا لأمراض التيتانوس، والخناق، والسعال الديكي، والمكورات السحائية، والمستدمية النزلية من النوع ب، والمكورات الرئوية.

2. لقاح الخناق والتيتانوس والسعال الديكي اللاخوي (DTaP). (الحد الأدنى للعمر: 6 أسابيع)

أ. يجب أن يتلقى الأطفال الذين يبدؤون سلسلة التطعيم في الوقت المحدد سلسلة من 5 جرعات من لقاح DTaP في سن شهرين، و4 أشهر، و6 أشهر، ومن 15 إلى 18 شهرًا، وفي سن 4 سنوات أو أكثر. يمكن تلقي الجرعة الرابعة في وقت مبكر من سن 12 شهرًا، بشرط انقضاء 6 أشهر على الأقل منذ الجرعة الثالثة. ومع ذلك، لا يلزم تكرار الجرعة الرابعة من لقاح DTaP إذا تم إعطاؤها بعد 4 أشهر على الأقل من الجرعة الثالثة من لقاح DTaP. يجب تلقي الجرعة النهائية من سلسلة التطعيم عند بلوغ العام الرابع أو بعده وبعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة السابقة.

ب. إذا تم إعطاء الجرعة الرابعة من لقاح DTaP في عمر 4 سنوات أو أكثر، وبعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثالثة، فإن الجرعة الخامسة (المعززة) من لقاح DTaP لا تكون مطلوبة.

ج. يجب على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات فأكثر والذين لم يتم تطعيمهم بالكامل بسلسلة لقاح DTaP للأطفال أن يتلقوا لقاح Tdap كجرعة أولى ضمن سلسلة التطعيم التعويضية؛ إذا كانت هناك حاجة لجرعات إضافية، فاستخدم لقاح Td أو Tdap. إذا تم تلقي الجرعة الأولى قبل بلوغهم عامهم الأول، فستكون ثمة حاجة إلى 4 جرعات، طالما تم تلقي الجرعة النهائية في سن 4 سنوات أو أكثر. إذا تم تلقي الجرعة الأولى عند بلوغ العام الأول أو بعده، فستكون ثمة حاجة إلى 3 جرعات، طالما تم تلقي الجرعة النهائية في سن 4 سنوات أو أكثر.

د. [لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التطعيم التعويضي الصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\) للأطفال من سن 4 أشهر إلى 6 سنوات.](#)

هـ. [لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التطعيم التعويضي الصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\) للأطفال من سن 7 إلى 9 سنوات.](#)

3. لقاح معزّز للمراهقين (Tdap) ضد التيتانوس والخناق والسعال الديكي اللاخوي. (الحد الأدنى للعمر للصفوف من 6 إلى 11: 10 سنوات؛ الحد الأدنى للعمر للصف 12: 7 سنوات).

أ. يُطلب من الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 11 سنة أو أكثر والذين يدخلون الصفوف من 6 إلى 12 الحصول على جرعة واحدة من لقاح Tdap.

ب. بالإضافة إلى متطلبات الصفوف من 6 إلى 12، يمكن أيضًا إعطاء لقاح Tdap كجزء من سلسلة التطعيم التعويضي للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات فأكثر والذين لم يتم تطعيمهم بالكامل بسلسلة لقاح DTaP للأطفال كما هو موضح أعلاه. في العام الدراسي 2025-2026، فقط جرعات Tdap المقدمة في سن 10 سنوات أو أكثر ستفي بمتطلبات لقاح Tdap للطلاب في الصفوف من 6 إلى 11؛ ومع ذلك، فإن جرعات Tdap التي يتم إعطاؤها في سن 7 سنوات أو أكثر ستفي بمتطلبات الطلاب في الصف 12.

ج. الطلاب الذين يبلغون من العمر 10 سنوات في الصف 6 والذين لم يتلقوا لقاح Tdap بعد يعتبروا ملتزمين بالمتطلبات حتى يبلغوا سن 11 سنة.

د. [لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التطعيم التعويضي الصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\) للأطفال من سن 10 إلى 18 سنة.](#)

4. لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) أو لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV). (الحد الأدنى للعمر: 6 أسابيع)

أ. يجب أن يتلقى الأطفال الذين يبدؤون سلسلة التطعيم في الوقت المحدد سلسلة من لقاح IPV في سن شهرين، و4 أشهر، ومن 6 أشهر إلى 18 شهرًا، وفي سن 4 سنوات أو أكثر. يجب تلقي الجرعة النهائية من سلسلة التطعيم عند بلوغ العام الرابع أو بعده وبعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة السابقة.

ب. بالنسبة إلى الطلاب الذين تلقوا جرعتهم الرابعة قبل سن الرابعة وقبل 7 أغسطس/ آب 2010، تكفي 4 جرعات يفصل بين كل منها 4 أسابيع على الأقل.

ج. إذا تم تلقي الجرعة الثالثة من لقاح شلل الأطفال في عمر 4 سنوات أو أكثر وبعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة السابقة، فلا تكون الجرعة الرابعة من لقاح شلل الأطفال مطلوبة.

د. بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم سجل من OPV، فإن لقاح شلل الأطفال الفموي ثلاثي التكافؤ (tOPV) فقط هو الذي يُحتسب ضمن متطلبات لقاح شلل الأطفال في المدارس بولاية نيويورك. يجب احتساب جرعات OPV المعطاة قبل 1 أبريل/ نيسان 2016، ما لم تتم الإشارة إليها على وجه التحديد على أنها أحادية التكافؤ أو ثنائية التكافؤ أو كما تم إعطاؤها خلال حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال. يجب عدم احتساب جرعات OPV المعطاة في 1 أبريل/ نيسان 2016 أو بعده.

هـ. [لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التطعيم التعويضي الصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\) للأطفال من سن 4 أشهر إلى 17 سنة.](#)

5. لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR). (الحد الأدنى للعمر: 12 شهرًا)

أ. يجب أن يتم تلقي الجرعة الأولى من لقاح MMR عند بلوغ العام الأول أو بعده. يجب أن يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 28 يومًا (4 أسابيع) على الأقل من الجرعة الأولى حتى تعتبرصالحة.

ب. الحصبة: يلزم جرعة واحدة لمرحلة ما قبل الروضة. يلزم جرعتان للصفوف من الروضة حتى الصف 12.

ج. النكاف: يلزم جرعة واحدة لمرحلة ما قبل الروضة. يلزم جرعتان للصفوف من الروضة حتى الصف 12.

د. الحصبة الألمانية: يلزم تلقي جرعة واحدة على الأقل لجميع الصفوف (من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف 12).

6. لقاح التهاب الكبد الوبائي ب

أ. يمكن إعطاء الجرعة الأولى عند الولادة أو في أي وقت بعد ذلك. يجب إعطاء الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع (28 يومًا) على الأقل من الجرعة الأولى. يجب إعطاء الجرعة الثالثة بعد 8 أسابيع على الأقل من الجرعة الثانية وبعد 16 أسبوعًا على الأقل من الجرعة الأولى وليس قبل سن 24 أسبوعًا (عند إعطاء 4 جرعات، يجب استبدال "الجرعة الرابعة" بـ "الجرعة الثالثة" في هذه الحسابات).

ب. جرعتان من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب (Recombivax) للبالغين يتم تلقيهما بعد 4 أشهر على الأقل في سن 11 إلى 15 سنة ستستوفيان المتطلبات.

7. لقاح جذري الماء (الحماق). (الحد الأدنى للعمر: 12 شهرًا)

أ. يجب أن يتم تلقي الجرعة الأولى من لقاح جذري الماء عند بلوغ العام الأول أو بعده. يجب أن يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 28 يومًا (4 أسابيع) على الأقل من الجرعة الأولى حتى تعتبرصالحة.

ب. بالنسبة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة، فإن الحد الأدنى الموصى به للفترة بين الجرعات هو 3 أشهر (إذا تم إعطاء الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع على الأقل من الجرعة الأولى، فيمكن قبولها على أنهاصالحة)؛ بالنسبة إلى الأشخاص في سن 13 سنة فأكثر، الحد الأدنى للفترة بين الجرعات هو 4 أسابيع.

8. لقاح المكورات السحائية المترافق (MenACWY). (الحد الأدنى للعمر للصفوف من 7 إلى 12: 10 سنوات).

أ. يجب على الطلاب الذين يدخلون الصفوف 7 و8 و9 و10 و11 تلقي جرعة واحدة من لقاح المكورات السحائية المترافق.

ب. بالنسبة إلى طلاب الصف 12، إذا تم تلقي الجرعة الأولى من لقاح المكورات السحائية المترافق في سن 16 سنة أو أكثر، فلا يلزم تلقي الجرعة الثانية (المعززة).

ج. يجب أن تكون الجرعة الثانية قد تم تلقيها عند سن 16 سنة أو أكثر. الحد الأدنى للفترة بين الجرعات هو 8 أسابيع.

9. لقاح المستدمية النزلية من النوع ب (Hib) المترافق. (الحد الأدنى للعمر: 6 أسابيع)

أ. يجب أن يتلقى الأطفال الذين يبدؤون سلسلة التطعيم في الوقت المحدد لقاح Hib في سن شهرين و4 أشهر و6 أشهر ومن 12 إلى 15 شهرًا. يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 شهرًا تلقي التطعيم التعويضي وفقًا لجدول التطعيم التعويضي التابع لـ ACIP. يجب تلقي الجرعة النهائية عند مرور 12 شهرًا أو بعد ذلك.

ب. إذا تم تلقي جرعتين من اللقاح قبل سن 12 شهرًا، فلن تكون هناك حاجة إلا إلى 3 جرعات، مع الجرعة الثالثة بعد 12 إلى 15 شهرًا و8 أسابيع على الأقل من الجرعة الثانية.

ج. إذا تم تلقي الجرعة الأولى في سن 12 إلى 14 شهرًا، فلن تكون هناك حاجة إلا إلى جرعتين، مع الجرعة الثانية بعد 8 أسابيع على الأقل من الجرعة الأولى.

د. إذا تم تلقي الجرعة الأولى في سن 15 شهرًا أو أكثر، فلن تكون هناك حاجة إلا لجرعة واحدة.

هـ. لا يلزم إعطاء لقاح Hib للأطفال في سن 5 سنوات أو أكثر.

و. [لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التطعيم التعويضي الصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\) للأطفال الأصحاء من سن 4 أشهر إلى 4 سنوات.](#)

10. لقاح المكورات الرئوية المترافق (PCV). (الحد الأدنى للعمر: 6 أسابيع)

أ. يجب أن يتلقى الأطفال الذين يبدؤون سلسلة التطعيم في الوقت المحدد لقاح PCV في سن شهرين و4 أشهر و6 أشهر ومن 12 إلى 15 شهرًا*. يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 شهرًا تلقي التطعيم التعويضي وفقًا لجدول التطعيم التعويضي التابع لـ ACIP. يجب تلقي الجرعة النهائية عند مرور 12 شهرًا أو بعد ذلك.

ب. يلزم أن يتلقى الأطفال غير المُطعمين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و11 شهرًا جرعتين، يفصل بين كل جرعة 4 أسابيع على الأقل، تليها جرعة ثالثة في سن 12 إلى 15 شهرًا.

ج. يلزم أن يتلقى الأطفال غير المُطعمين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرًا جرعتين من اللقاح يفصل بين كل جرعة 8 أسابيع على الأقل.

د. إذا تم تلقي جرعة واحدة من اللقاح في عمر 24 شهرًا أو أكثر، فلن تكون هناك حاجة لجرعات أخرى.

هـ. لا يلزم إعطاء لقاح PCV للأطفال بعمر 5 سنوات أو أكثر.

و. [لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التطعيم التعويضي الصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\) للأطفال الأصحاء من سن 4 أشهر إلى 4 سنوات.](#)

* قد يتغير جدول التطعيمات حسب نوع اللقاح.

للحصول على المزيد من المعلومات، تواصل مع:

New York State Department of Health
Division of Vaccine Excellence
Room 649, Corning Tower ESP
Albany, NY 12237
(518) 473-4437

New York City Department of Health and Mental Hygiene
School Compliance Unit, Bureau of Immunization
42-09 28th Street, 5th floor
Long Island City, NY 11101
(347) 396-2433

إدارة الصحة بولاية نيويورك (New York State Department of Health)

قسم التميز في تقديم اللقاحات (Division of Vaccine Excellence)

health.ny.gov/immunization