

Anno scolastico 2025-26

Obblighi vaccinali dello Stato di New York per l'iscrizione a scuola/la frequenza scolastica¹

NOTE:
Per poter frequentare la scuola nello Stato di New York tutti i bambini devono essere vaccinati in base al calendario vaccinale vigente. Il numero di dosi dipende dal calendario raccomandato dal Comitato consultivo sulle prassi vaccinali (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP). Gli intervalli tra le dosi di vaccino devono rispettare il [“Calendario vaccinale per bambini e adolescenti raccomandato dall'ACIP” \(ACIP-Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule\)](#). Le dosi ricevute prima dell'età minima o degli intervalli previsti dal calendario vaccinale non sono considerate valide e non vengono contate nel numero di dosi indicate di seguito. Per informazioni dettagliate sui singoli vaccini consultare le note a piè di pagina. I bambini che si iscrivono a pluriclassi devono aver adempiuto agli obblighi vaccinali previsti per i bambini di età equivalente.

Le dosi richieste DEVONO essere lette tenendo conto delle note a piè di pagina

Vaccini	Servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido, Head Start, nido e scuola dell'infanzia)	Scuola materna e classi 1, 2, 3, 4 e 5	Classi 6, 7, 8, 9, 10 e 11	Classe 12
Vaccino antidifterite e antitetanico e vaccino anti-pertosse (DTaP/DTP/Tdap/Td) ²	4 dosi	5 dosi o 4 dosi se la quarta dose è stata somministrata a 4 anni compiuti e il ciclo è iniziato quando il bambino aveva meno di 1 anno di età 3 dosi se il bambino ha almeno 7 anni e il ciclo è iniziato dopo che ha compiuto 1 anno	3 dosi	
Vaccino antitetanico e antidifterite e richiamo vaccinale antipertosse per adolescenti (Tdap) ³	Non applicabile		1 dose somministrata dopo i 10 anni	
Vaccino antipolio (IPV/OPV) ⁴	3 dosi	4 dosi o 3 dosi se la terza dose è stata somministrata a 4 anni compiuti		
Vaccino combinato morbillo, parotite, rosolia (MPR) ⁵	1 dose	2 dosi		
Vaccino per l'epatite B ⁶	3 dosi	3 dosi o 2 dosi di vaccino per l'epatite B per adulti (Recombivax) per i ragazzi che hanno ricevuto le dosi a distanza di almeno 4 mesi una dall'altra e di età compresa tra gli 11 e i 15 anni		
Vaccino antivaricella ⁷	1 dose	2 dosi		
Vaccino antimeningococco coniugato (MenACWY) ⁸	Non applicabile		Classi 7, 8, 9, 10, 10 e 11: 1 dose	Classe 12: 2 dosi o 1 dose se la dose è stata somministrata a 16 anni compiuti
Vaccino coniugato contro l'Haemophilus influenzae di tipo b (Hib) ⁹	Da 1 a 4 dosi	Non applicabile		
Vaccino antipneumococco coniugato (PCV) ¹⁰	Da 1 a 4 dosi	Non applicabile		

1. La diagnosi sierologica di anticorpi per morbillo, parotite o rosolia o la conferma da parte del laboratorio di queste malattie è considerata prova accettabile di immunità alle stesse. I test sierologici per la poliomielite sono considerati prova accettabile di immunità solo se il test è stato eseguito prima del 1° settembre 2019 e tutti e tre i sierotipi sono risultati positivi. L'esame del sangue positivo per l'anticorpo di superficie dell'epatite B è considerato prova accettabile di immunità all'epatite B. L'evidenza sierologica dimostrata di anticorpi per la varicella, l'esame di laboratorio attestante la malattia della varicella o la dichiarazione di un medico, di un assistente medico sanitario o di un infermiere che attesti che il bambino ha avuto la varicella sono considerati prova accettabile di immunità alla malattia.
* I titoli sierologici non sono mai accettati per il tetano, la difterite, la pertosse, il meningococco, l'Haemophilus influenzae di tipo b e le malattie pneumococciche.
2. Vaccino antidifterite e antitetanico e vaccino antipertosse acellulare (DTaP). (Età minima: 6 settimane)
 - a. I bambini che iniziano il ciclo nei tempi previsti devono ricevere un ciclo vaccinale DTaP di 5 dosi a 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi, fra 15 e 18 mesi e a 4 anni compiuti. La quarta dose può essere somministrata già all'età di 12 mesi, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla terza dose. Tuttavia, la quarta dose di DTaP non deve essere ripetuta se è stata somministrata a distanza di almeno 4 mesi dalla terza dose di DTaP. L'ultima dose del ciclo deve essere somministrata a 4 anni compiuti e almeno 6 mesi dopo la dose precedente.
 - b. Se la quarta dose di DTaP è stata somministrata a 4 anni compiuti e almeno 6 mesi dopo la dose terza dose, non è richiesta la quinta dose (richiamo) di vaccino DTaP.
 - c. Ai bambini di 7 anni compiuti che non siano stati completamente vaccinati con il ciclo vaccinale pediatrico DTaP deve essere somministrato il vaccino Tdap come prima dose del ciclo di recupero; qualora fossero necessarie ulteriori dosi, somministrare il vaccino Td o Tdap. Se la prima dose è stata somministrata prima del compimento del primo anno di età, sono richieste 4 dosi, a condizione che l'ultima dose sia stata somministrata a 4 anni compiuti. Se la prima dose è stata somministrata dopo il compimento del primo anno di età, sono richieste 3 dosi, a condizione che l'ultima dose sia stata somministrata a 4 anni compiuti.
 - d. [Per ulteriori informazioni consultare la Guida alle vaccinazioni di recupero dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie \(CDC Catch-Up Guidance\) per bambini di età compresa fra 4 mesi e 6 anni.](#)
 - e. [Per ulteriori informazioni consultare la Guida alle vaccinazioni di recupero dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie per bambini di età compresa fra 7 e 9 anni.](#)
3. Richiamo vaccinale per il tetano, la difterite e la pertosse acellulare per adolescenti (Tdap). (Età minima per le classi da 6 a 11: 10 anni; età minima per la classe 12: 7 anni).
 - a. A partire dagli 11 anni di età, gli studenti che accedono alle classi da 6 a 12 hanno l'obbligo di vaccinarsi con una dose di Tdap.
 - b. Oltre all'obbligo per gli studenti delle classi da 6 a 12, il Tdap può essere somministrato anche nell'ambito del ciclo di recupero ai bambini a partire dai 7 anni compiuti che non siano stati completamente vaccinati con il ciclo DTaP pediatrico, secondo le modalità sopra descritte. Nell'anno scolastico 2025-26 solo le dosi di vaccini Tdap somministrate all'età di 10 anni o successivamente soddisfano il requisito Tdap per gli studenti delle classi da 6 a 11; tuttavia, le dosi di vaccino Tdap somministrate a 7 anni di età o successivamente soddisfano il requisito per gli studenti della classe 12.
 - c. Gli studenti di 10 anni che frequentano la classe 6 e non hanno ancora ricevuto il vaccino Tdap sono in regola fino al compimento dell'11° anno di età.
 - d. [Per ulteriori informazioni consultare la Guida alle vaccinazioni di recupero dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie per ragazzi di età compresa fra 10 e 18 anni.](#)
4. Vaccino antipolio inattivato (IPV) oppure vaccino vivo attenuato (OPV). (Età minima: 6 settimane)
 - a. I bambini che iniziano il ciclo nei tempi previsti devono ricevere le dosi IPV a 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi, 18 mesi e 4 anni compiuti. L'ultima dose del ciclo deve essere somministrata a 4 anni compiuti e almeno 6 mesi dopo la dose precedente.
 - b. Per i bambini che hanno ricevuto la quarta dose prima dei 4 anni di età e prima del 7 agosto 2010, sono sufficienti 4 dosi somministrate alla distanza di almeno 4 settimane.
 - c. Se la terza dose di vaccino antipolio è stata somministrata a 4 anni compiuti e almeno 6 mesi dopo la dose precedente, la quarta dose non è richiesta.
 - d. Per i bambini con certificato di OPV, ai fini degli obblighi vaccinali contro la poliomielite per le scuole dello Stato di New York viene contato solo l'OPV trivalente (tOPV). Le dosi di OPV somministrate prima del 1° aprile 2016 devono essere contate a meno che non si tratti di vaccini monovalenti o bivalenti o di dosi somministrate in campagne vaccinali contro il poliovirus. Le dosi di OPV somministrate dopo il 1° aprile 2016 non devono essere contate.
 - e. [Per ulteriori informazioni consultare la Guida alle vaccinazioni di recupero dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie per bambini/ragazzi di età compresa fra 4 mesi e 17 anni.](#)
5. Vaccino combinato morbillo, parotite, rosolia (MPR). (Età minima: 12 mesi)
 - a. La prima dose di vaccino MPR deve essere stata somministrata a partire dal primo anno di età. Per essere considerata valida, la seconda dose deve essere stata somministrata almeno 28 giorni (4 settimane) dopo la prima.
 - b. Morbillo: per i servizi educativi per la prima infanzia è richiesta una dose. Per i bambini dalla scuola materna alla classe 12 sono richieste due dosi.
 - c. Parotite: per i servizi educativi per la prima infanzia è richiesta una dose. Per i bambini dalla scuola materna alla classe 12 sono richieste due dosi.
 - d. Rosolia: per tutte le classi (dalla scuola materna alla classe 12) è richiesta almeno una dose.
6. Vaccino per l'epatite B
 - a. La prima dose può essere somministrata alla nascita o in qualsiasi altro momento. La seconda dose deve essere somministrata almeno 4 settimane (28 giorni) dopo la prima dose. La terza dose deve essere somministrata almeno 8 settimane dopo la seconda e almeno 16 settimane dopo la prima e non prima delle 24 settimane di età (in caso di somministrazione di 4 dosi, sostituire "quarta dose" con "terza dose" in questo calcolo).
 - b. Due dosi di vaccino per l'epatite B per adulti (Recombivax) somministrate a distanza di almeno 4 mesi l'una dall'altra all'età di 11-15 anni soddisfano l'obbligo vaccinale.
7. Vaccino antivaricella. (Età minima: 12 mesi)
 - a. La prima dose di vaccino antivaricella deve essere somministrata a partire dal primo anno di età. Per essere considerata valida, la seconda dose deve essere stata somministrata almeno 28 giorni (4 settimane) dopo la prima.
 - b. Per i minori di 13 anni l'intervallo minimo raccomandato tra le dosi è di 3 mesi (se la seconda dose è stata somministrata almeno 4 settimane dopo la prima, può essere considerata valida); per chi ha compiuto 13 anni, l'intervallo minimo tra le dosi è di 4 settimane.
8. Vaccino antimeningococco coniugato ACWY (MenACWY). (Età minima per le classi da 7 a 12: 10 anni).
 - a. È richiesta una dose di vaccino anti-meningococco coniugato per gli studenti che accedono alle classi 7, 8, 9, 10 e 11.
 - b. Per gli studenti della classe 12, se la prima dose di vaccino anti-meningococco coniugato è stata somministrata a 16 anni compiuti, non è richiesta la seconda dose (richiamo).
 - c. La seconda dose deve essere stata somministrata a 16 anni compiuti. L'intervallo minimo tra le dosi è di 8 settimane.
9. Vaccino coniugato contro l'Haemophilus influenzae di tipo b (Hib). (Età minima: 6 settimane)
 - a. I bambini che iniziano il ciclo nei tempi previsti devono ricevere le dosi di vaccino Hib a 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi e fra 12 e 15 mesi. I bambini di età superiore a 15 mesi devono mettersi in regola secondo il calendario di recupero dell'ACIP. L'ultima dose deve essere somministrata a 12 mesi compiuti.
 - b. Se sono state somministrate 2 dosi di vaccino prima dei 12 mesi di età, sono necessarie solo 3 dosi, di cui la terza tra i 12 e i 15 mesi e almeno 8 settimane dopo la seconda dose.
 - c. Se la prima dose è stata somministrata all'età di 12-14 mesi, sono richieste solo 2 dosi, di cui la seconda almeno 8 settimane dopo la prima.
 - d. Se la prima dose è stata somministrata a 15 mesi compiuti, è richiesta solo una dose.
 - e. Il vaccino Hib non è richiesto per i bambini che hanno compiuto i 5 anni.
 - f. [Per ulteriori informazioni consultare la Guida alle vaccinazioni di recupero dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie per bambini in buona salute di età compresa fra 4 mesi e 4 anni.](#)
10. Vaccino antipneumococco coniugato (PCV). (Età minima: 6 settimane)
 - a. I bambini che iniziano il ciclo nei tempi previsti devono ricevere le dosi di vaccino Hib a 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi e fra i 12 e i 15 mesi*. I bambini di età superiore a 15 mesi devono mettersi in regola secondo il calendario di recupero dell'ACIP. L'ultima dose deve essere somministrata a 12 mesi compiuti.
 - b. I bambini non vaccinati di età compresa tra i 7 e gli 11 mesi devono ricevere 2 dosi, a distanza di almeno 4 settimane una dall'altra, seguite da una terza dose tra i 12 e i 15 mesi.
 - c. I bambini non vaccinati di età compresa tra i 12 e i 23 mesi devono ricevere 2 dosi di vaccino a distanza di almeno 8 settimane.
 - d. Se una dose di vaccino è stata somministrata a 24 mesi compiuti, non sono richieste altre dosi.
 - e. Il vaccino PCV non è richiesto per i bambini che hanno compiuto i 5 anni.
 - f. [Per ulteriori informazioni consultare la Guida alle vaccinazioni di recupero dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie per bambini in buona salute di età compresa fra 4 mesi e 4 anni.](#)

Per ulteriore informazioni rivolgersi a:

**New York State Department of Health
Division of Vaccine Excellence
Room 649, Corning Tower ESP
Albany, NY 12237
(518) 473-4437**

**New York City Department of Health and Mental Hygiene
School Compliance Unit, Bureau of Immunization
42-09 28th Street, 5th floor
Long Island City, NY 11101
(347) 396-2433**

Dipartimento della salute dello Stato di New York
(New York State Department of Health) /
Divisione per l'Eccellenza vaccinale
(Division of Vaccine Excellence)
health.ny.gov/immunization