

Ano Letivo de 2025-26

Exigências de Imunização do Estado de Nova York

para Ingresso/Frequência Escolar¹

OBSERVAÇÕES:

Todas as crianças devem estar imunizadas de acordo com a idade para frequentar a escola no Estado de Nova York. O número de doses depende do calendário de vacinação recomendado pelo Comitê Consultivo de Práticas de Imunização (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP). Os intervalos entre as doses da vacina devem estar de acordo com o “[Calendário de Imunização Infantil e Adolescente Recomendado pelo ACIP \(ACIP-Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule\)](#).” Doses administradas antes da idade mínima ou dos intervalos indicados no calendário de vacinação não são válidas e não são levadas em consideração para o número de doses listado abaixo. Consulte as notas de rodapé para obter informações específicas sobre cada vacina. Crianças matriculadas em turmas sem atribuição formal do ano escolar devem atender aos requisitos de imunização correspondentes ao ano escolar equivalente à sua idade.

As exigências de doses **PRECISAM** ser lidas juntamente com as notas de rodapé deste calendário de vacinação.

Vacinas	Pré-jardim de infância (creche, Head Start, berçário ou pré-K)	Jardim de infância e 1º, 2º, 3º, 4º e 5º (ano escolar)	6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º (ano escolar)	12º (ano escolar)
Vacina contendo toxoide diftérico e tetânico e componente pertussis (DTaP/DTP/Tdap/Td) ²	4 doses	5 doses ou 4 doses se a 4ª dose foi aplicada com 4 anos ou mais e a série de vacinas foi iniciada com menos de 1 ano de idade ou 3 doses se tiver 7 anos ou mais e a série de vacinas foi iniciada com 1 ano ou mais	3 doses	
Vacina contendo toxoides tetânico e diftérico e componente pertussis – dose de reforço para adolescentes ³	Não aplicável		1 dose administrada após 10 anos de idade	
Vacina contra poliomielite (IPV/OPV) ⁴	3 doses	4 doses ou 3 doses se a 3ª dose foi recebida com 4 (anos de idade) ou mais		
Vacina tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola (MMR) ⁵	1 dose	2 doses		
Vacina contra hepatite B ⁶	3 doses	3 doses ou 2 doses da vacina contra hepatite B para adultos (Recombivax) para crianças que receberam as doses com pelo menos 4 meses de intervalo e entre 11 e 15 anos de idade		
Vacina contra varicela (catapora) ⁷	1 dose	2 doses		
Vacina meningocócica conjugada (MenACWY) ⁸	Não aplicável		7º, 8º, 9º, 10º e 11º (ano escolar): 1 dose	12º (ano escolar): 2 doses ou 1 dose se a dose foi recebida com 16 (anos de idade) ou mais
Vacina conjugada contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) ⁹	1 a 4 doses	Não aplicável		
Vacina pneumocócica conjugada (PCV) ¹⁰	1 a 4 doses	Não aplicável		

- A comprovação de anticorpos contra sarampo, caxumba ou rubéola, ou a confirmação laboratorial dessas doenças, constitui comprovação aceitável de imunidade a essas doenças. Exames sorológicos para pólio são aceitos como comprovação de imunidade somente se tiverem sido realizados antes de 1º de setembro de 2019 e se os três sorotipos tiverem resultado positivo. Um exame de sangue positivo para anticorpos contra o antígeno de superfície da hepatite B é uma comprovação aceitável de imunidade à hepatite B. A comprovação sorológica de anticorpos contra varicela, a confirmação laboratorial da doença ou o diagnóstico feito por um médico, assistente médico ou enfermeiro(a) de prática avançada de que a criança já teve varicela constituem comprovação aceitável de imunidade à varicela.

*Títulos sorológicos não são aceitos como comprovação para tétano, difteria, pertussis, meningococo, Haemophilus influenzae tipo b e pneumococo.
- Vacina contendo toxoides diftérico e tetânico e componente pertussis acelular (DTaP). (Idade mínima: 6 semanas)
 - Crianças que iniciam a série de imunizações no tempo recomendado devem receber 5 doses da vacina DTaP aos 2 meses, 4 meses, 6 meses, entre 15 e 18 meses e aos 4 anos de idade ou mais. A quarta dose pode ser administrada a partir dos 12 meses, desde que tenham se passado pelo menos 6 meses desde a terceira dose. No entanto, a quarta dose de DTaP não precisa ser repetida se tiver sido administrada pelo menos 4 meses após a terceira dose. A dose final da série de vacinas deve ser administrada no quarto aniversário ou posteriormente, e pelo menos 6 meses após a dose anterior.
 - Se a quarta dose de DTaP foi administrada aos 4 (anos de idade) ou mais, e pelo menos 6 meses após a dose 3, a quinta dose (reforço) não é necessária.
 - Crianças de 7 anos ou mais que não completaram a série infantil de vacinas de DTaP devem receber Tdap como primeira dose da série de atualização de vacinas (catch-up). Se doses adicionais forem necessárias, usar Td ou Tdap. Se a primeira dose foi recebida antes do primeiro aniversário, 4 doses são necessárias, desde que a dose final tenha sido administrada aos 4 anos ou mais. Se a primeira dose foi recebida no primeiro aniversário ou posteriormente, 3 doses são necessárias, desde que a dose final tenha sido administrada aos 4 anos ou mais.
 - Para obter mais informações, consulte as [Diretrizes de Atualização de Vacinas de \(Catch-Up\) do CDC para crianças de 4 meses a 6 anos de idade](#).
 - Para obter mais informações, consulte as [Diretrizes de Atualização de Vacinas de \(Catch-Up\) do CDC para crianças de 7 a 9 anos de idade](#).
- Vacina de reforço para adolescentes contra e componente pertussis acelular (Tdap). (Idade mínima para os anos escolares do 6º ao 11º ano: 10 anos; idade mínima para o ano escolar 12º ano: 7 (anos de idade)).
 - Alunos com 11 anos ou mais que ingressam nos anos escolares desde o 6º até 12º ano devem receber uma dose de Tdap.
 - Além da exigência do 6º até 12º (ano escolar), a Tdap também pode ser administrada como parte da série de atualização de vacinas (catch-up) para alunos de 7 anos de idade ou mais que não foram totalmente imunizados com a série infantil de vacinas de DTaP. No ano letivo de 2025-26, apenas doses de Tdap administradas em crianças de 10 anos ou mais atenderão à exigência referente aos anos escolares do 6º até o 11º ano. Contudo, doses administradas em crianças de 7 anos ou mais atenderão à exigência para alunos do 12º ano.
 - Alunos de 10 anos de idade no 6º (ano escolar) e que ainda não receberam a vacina Tdap estão em conformidade até completarem 11 anos de idade.
 - Para mais informações, consulte as [Diretrizes de Atualização de Vacinas de \(Catch-Up\) do CDC para crianças de 10 meses a 18 anos de idade](#).
- Vacina inativada contra poliomielite (IPV) ou vacina oral contra poliomielite (OPV). (Idade mínima: 6 semanas)
 - Crianças que iniciam a série de vacinas no tempo recomendado devem receber a série de IPV aos 2 meses, 4 meses, entre 6 e 18 meses e aos 4 anos de idade ou mais. A dose final da série de vacinas deve ser administrada no quarto aniversário ou posteriormente, e pelo menos 6 meses após a dose anterior.
 - Para alunos que receberam a quarta dose antes dos 4 (anos de idade) e antes de 7 de agosto de 2010, 4 doses com pelo menos 4 semanas de intervalo são suficientes.
 - Se a terceira dose foi administrada aos 4 (anos de idade) ou mais e pelo menos 6 meses após a dose anterior, a quarta dose não é necessária.
 - Para crianças com comprovação documentada de aplicação da vacina de OPV, apenas a OPV trivalente (tOPV) é considerada válida para atender às exigências de vacinação contra poliomielite das escolas do Estado de Nova York. Doses de OPV administradas antes de 1º de abril de 2016 devem ser consideradas válidas, a menos que especificadas como monovalente, bivalente ou administradas em campanha. Doses de OPV administradas em ou após 1º de abril de 2016 não devem ser consideradas válidas.
 - Para obter mais informações, consulte as [Diretrizes de Atualização de Vacinas de \(Catch-Up\) do CDC para crianças de 4 meses a 17 anos de idade](#).
- Vacina tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola (MMR). (Idade mínima: 12 meses)
 - A primeira dose da vacina tríplice viral (MMR) deve ter sido administrada no primeiro aniversário ou depois. A segunda dose deve ter sido administrada pelo menos 28 dias (4 semanas) após a primeira dose para ser considerada válida.
 - Sarampo: Uma dose é exigida para pré-jardim de infância. Duas doses são exigidas do jardim de infância até o 12º (ano escolar).
 - Caxumba: Uma dose é exigida para pré-jardim de infância. Duas doses são exigidas do jardim de infância até o 12º (ano escolar).
 - Rubéola: Pelo menos uma dose é exigida para todos os anos escolares (pré-jardim da infância ao 12º (ano escolar)).
- Vacina contra hepatite B
 - A dose 1 pode ser administrada ao nascer ou a qualquer momento depois. A dose 2 deve ser administrada pelo menos 4 semanas (28 dias) após a dose 1. A dose 3 deve ser aplicada pelo menos 8 semanas após a dose 2 E pelo menos 16 semanas após a dose 1 E não antes das 24 semanas de idade (quando 4 doses são administradas, substitua “dose 4” por “dose 3” nesses cálculos).
 - Duas doses da vacina adulta contra hepatite B (Recombivax), administradas com pelo menos 4 meses de intervalo entre 11 e 15 anos de idade, atendem à exigência.
- Vacina contra varicela (catapora). (Idade mínima: 12 meses)
 - A primeira dose deve ter sido administrada no primeiro aniversário ou posteriormente. A segunda dose deve ter sido administrada pelo menos 28 dias (4 semanas) após a primeira dose para ser considerada válida.
 - Para crianças menores de 13 anos, o intervalo mínimo recomendado entre as doses é de 3 meses (se a segunda dose tiver sido administrada pelo menos 4 semanas após a primeira, ela pode ser considerada válida); para pessoas de 13 anos ou mais, o intervalo mínimo entre as doses é de 4 semanas.
- Vacina meningocócica conjugada ACWY (MenACWY). (Idade mínima para os anos escolares do 7º ao 12º ano: 10 anos).
 - Uma dose da vacina meningocócica conjugada é exigida para alunos dos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º (ano escolar).
 - Para alunos do 12º ano, se a primeira dose da vacina meningocócica conjugada tiver sido administrada aos 16 anos de idade ou mais, a segunda dose (de reforço) não é exigida.
 - A segunda dose deve ter sido administrada com 16 anos de idade ou mais. O intervalo mínimo entre as doses é de 8 semanas.
- Vacina conjugada contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib). (Idade mínima: 6 semanas)
 - Crianças que iniciam a série de vacinas no tempo recomendado devem receber a vacina Hib aos 2 meses, 4 meses, 6 meses e entre 12 e 15 meses de idade. A vacinação de crianças com mais de 15 meses de idade deve estar atualizada de acordo com o calendário de atualização de vacinas (catch-up) do ACIP. A dose final deve ser administrada aos 12 meses de idade ou mais.
 - Se 2 doses da vacina tiverem sido administradas antes dos 12 meses de idade, apenas 3 doses são necessárias, com a dose 3 entre 12 e 15 meses de idade e pelo menos 8 semanas após a dose 2.
 - Se a dose 1 tiver sido administrada entre 12 e 14 meses de idade, apenas 2 doses são necessárias, com a dose 2 pelo menos 8 semanas após a dose 1.
 - Se a dose 1 foi aos 15 meses de idade ou mais, apenas 1 dose é necessária.
 - A vacina Hib não é exigida para crianças com 5 anos de idade ou mais.
 - Para obter mais informações, consulte as [Diretrizes de Atualização de Vacinas de \(Catch-Up\) do CDC para crianças saudáveis de 4 meses a 4 anos de idade](#).
- Vacina pneumocócica conjugada (PCV) (Idade mínima: 6 semanas)
 - Crianças que iniciam a série de vacinas no tempo recomendado devem receber a vacina PCV aos 2 meses, 4 meses, 6 meses e entre 12 e 15 meses de idade. A vacinação de crianças com mais de 15 meses de idade deve estar atualizada de acordo com o calendário de atualização de vacinas (catch-up) do ACIP. A dose final deve ser administrada aos 12 meses de idade ou mais.
 - Crianças não vacinadas de 7 a 11 meses de idade devem receber 2 doses, com pelo menos 4 semanas de intervalo, seguidas de uma terceira dose entre 12 e 15 meses de idade.
 - Crianças não vacinadas de 12 a 23 meses de idade devem receber 2 doses da vacina com pelo menos 8 semanas de intervalo.
 - Se uma dose da vacina tiver sido administrada aos 24 meses de idade ou mais, nenhuma dose adicional é necessária.
 - A PCV não é exigida para crianças com 5 anos de idade ou mais.
 - Para obter mais informações, consulte as [Diretrizes de Atualização de Vacinas de \(Catch-Up\) do CDC para crianças saudáveis de 4 meses a 4 anos de idade](#).

* Dependendo da marca da vacina, o calendário pode variar.

Para obter mais informações, entre em contato com:

**New York State Department of Health
Division of Vaccine Excellence
Room 649, Corning Tower ESP
Albany, NY 12237
(518) 473-4437**

**New York City Department of Health and Mental Hygiene
School Compliance Unit, Bureau of Immunization
42-09 28th Street, 5th floor
Long Island City, NY 11101
(347) 396-2433**

Departamento de Saúde do Estado de Nova York (New York State Department of Health)/
Divisão de Excelência em Vacinação (Division of Vaccine Excellence)
health.ny.gov/immunization