

Czy cytomegalię wrodzoną można leczyć?

Jeśli dziecko ma cytomegalię wrodzoną, lekarz może zaproponować podawanie leku antywirusowego. Lek ten może pomóc dziecku lepiej słyszeć i zdrowo się rozwijać. Nie wszystkie metody leczenia wiążą się z przyjmowaniem leków. Niemowlęta z cytomegalią wrodzoną mogą uzyskać potrzebne wsparcie w ramach Programu Wczesnej Interwencji (Early Intervention Program, EIP). EIP może im pomóc w poprawie umiejętności komunikacyjnych, językowych i społecznych.

Skoro moje dziecko słyszy „normalnie”, to czy mimo to może mieć cytomegalię wrodzoną?

Niektóre dzieci z ubytkiem słuchu mogą dobrze wypadać w badaniu słuchu noworodka, ale nadal mieć cytomegalię wrodzoną. Ważne jest, aby po powrocie do domu ze szpitala monitorować stan dziecka. Jeśli u dziecka zaczynają się pojawiać objawy cytomegalii wrodzonej, takie jak utrata słuchu, trzeba porozmawiać o swoich obawach z lekarzem prowadzącym. Jako wskazówki w rozpoznawaniu ewentualnych oznak utraty słuchu u dziecka można użyć „Listy kontrolnej dobrego słuchu”.

Zasoby

Wydział Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health)

www.health.ny.gov/diseases/communicable/cytomegalovirus/fact_sheet.htm

Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (Centers for Disease Control and Prevention)

www.cdc.gov/cmrv

Program Wczesnego Wykrywania Problemów ze Słuchem i Interwencji Stanu Nowy Jork (New York State Early Hearing and Detection Intervention Program)

www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/newborn_hearing_screening/



Cytomegalia wrodzona jest jedną z głównych przyczyn pozagenetycznych utraty słuchu u dzieci.

Badanie w kierunku wrodzonego wirusa cytomegalii (CMV) a Twoje dziecko



Department
of Health



Department
of Health

Dla osób w ciąży lub mogących zajść w ciążę



Lista kontrolna dobrego słuchu

Co to jest wrodzony wirus cytomegalii (cytomegalovirus, CMV)? (wymowa w jęz. angielskim saj-tou-MEG-a-lou-vaj-rys)

CMV to wirus, który może zaatakować osobę w każdym wieku. Może powodować objawy grypopodobne, ale zazwyczaj nie wywołuje choroby. Osoba w ciąży zakażona wirusem CMV może przekazać wywołaną nim cytomegalię rozwijającemu się dziecku. Mówi się, że dziecko urodzone z CMV ma cytomegalię wrodzoną.

U dziecka z cytomegalią wrodzoną mogą się rozwijać problemy zdrowotne, takie jak utrata słuchu lub wzroku, opóźnienia rozwojowe i napady drgawkowe. Dziecko może też się urodzić z małą główką.

Niektóre niemowlęta z cytomegalią wrodzoną wykazują po urodzeniu objawy widoczne dla lekarza dziecka. Inne niemowlęta nie wykazują po urodzeniu żadnych objawów cytomegalii wrodzonej.

Najczęstszym objawem zakażenia cytomegalią wrodzoną jest ubytek słuchu. Może występować po urodzeniu lub na późniejszych etapach życia.

Po czym poznać, że dziecko ma cytomegalię wrodzoną?

U wszystkich noworodków w stanie Nowy Jork jest badany słuch. Badanie słuchu jest szybkie i bezbolesne, a wykonać je można podczas snu dziecka. Przed wyjściem lub po wyjściu ze szpitala może być konieczne ponowne sprawdzenie słuchu dziecka. W takim przypadku świadczeniodawca medyczny dziecka powinien je zbadać pod kątem cytomegalii wrodzonej. Badanie to można wykonać na podstawie śliny lub moczu dziecka. Wyniki testu mogą wykazać, czy dziecko jest zarażone cytomegalią wrodzoną, która może powodować problemy zdrowotne.

Od narodzin do 3 miesięcy

- Milknie w otoczeniu codziennych głosów lub dźwięków
- Reaguje na głośne dźwięki: dziecko wzdyga się, mruga, przestaje ssać, płacze lub się budzi
- Po przebudzeniu wydaje ciche dźwięki, gaworzy

Od 3 do 6 miesięcy

- Zwraca wzrok lub głowę w stronę dźwięków, głosów, zabawek wydających dźwięki, szczekającego psa
- Zaczyna wydawać dźwięki przypominające mowę: „ga”, „uuu” „ba” oraz głoski p, b, m
- Reaguje na zmiany tonu Twojego głosu

Od 6 do 9 miesięcy

- Reaguje na ciche dźwięki, szczególnie na mówienie
- Reaguje na własne imię
- Rozumie proste słowa: „nie”, „pa, pa”, „sok”
- Gaworzy: „da, da, da”, „ma, ma, ma”

Od 9 do 12 miesięcy

- Reaguje na dźwięki zarówno ciche, jak i głośne
- Powtarza pojedyncze słowa i dźwięki
- W odpowiedzi na pytanie wskazuje ulubione zabawki lub jedzenie

Od 12 do 18 miesięcy

- Używa 10 lub większej liczby słów
- Wykonuje proste polecenia słowne: „weź piłkę”
- Wskazuje osoby, części ciała lub zabawki

Od 18 do 24 miesięcy

- Używa 20 lub większej liczby słów
- Łączy dwa lub więcej słów: „jeszcze soku” „co to?”
- Używa różnych spółgłosek na początku słów: b, g, m
- Słucha prostych bajek i piosenek

Od 2 do 3 lat

- Buduje zdania z dwóch lub trzech słów
- W wieku 2 lat mowa dziecka jest zrozumiała czasami (25%–50%)
- W wieku 3 lat mowa dziecka jest zazwyczaj zrozumiała (50%–75%)
- Wykonuje dwuetapowe polecenia: „weź piłkę i włóż ją do pudełka”

Na podstawie listy kontrolnej Wydziału Usług Zdrowotnych stanu Kalifornia (California Department of Health Services).

Obawy dotyczące rozwoju dziecka należy zgłaszać jego świadczeniodawcy medycznemu.