

# Cómo usar las tiras reactivas para detectar fentanilo



**1** Coloque un poco de la droga en una tapa de botella o en una taza pequeña.


Aplaste las tabletas, las píldoras y los cristales hasta obtener un polvo.

**¿No realiza la prueba con una tableta/píldora completa?** Pártala por la mitad. Corte desde el centro.

**¿Quiere hacer una prueba antes de inyectarse?** Haga una prueba con los residuos que quedan en la olla. Agregue 1 ml de agua. Siga los pasos 3 y 4.

**3** Sostenga el extremo azul de la tira. Ponga el otro extremo en el líquido, sin sobrepasar la línea azul.

Deje que el líquido suba por la tira hasta la zona de prueba. Tarda unos 15 segundos.




**2** Agregue la cantidad de agua correcta según la cantidad de droga que tenga. Vea **“Agregue agua”**. Disuelva la droga por completo. Revuelva con una cuchara limpia.

## Agregue agua

**Para la metanfetamina, la cocaína o el MDMA:** por cada 10 mg de polvo, agregue una cucharadita de agua (5 ml).

**Para todas las otras drogas:** por cada 50 mg de polvo, agregue una cucharadita de agua (5 ml).



**4** Coloque la tira en una superficie plana. Espere unos 3 minutos. Vea **“Cómo leer los resultados de la prueba”**.




## Cómo leer los resultados de la prueba

**UNA línea ROJA = POSITIVO, contiene fentanilo**




**DOS líneas ROJAS = NEGATIVO, no contiene fentanilo**

(incluso si la segunda línea no es nítida, el resultado aún es negativo)



**NO hay línea = FALSO/NO ES PRECISO, vuelva a realizar la prueba de la droga**



**Recuerde: 1P 2N**

## Opciones si hay presencia de fentanilo

- No use la droga.
- Tenga naloxona a mano.
- Evite mezclar con otras drogas.
- Consuma menos y vaya despacio.
- Use con otras personas que puedan llamar al 911 en caso de que presente una mala reacción o llame a Never Use Alone (Nunca consuma solo): 877-696-1996

**¿Cree que alguien tiene una sobredosis?**

**Llame al 911 de inmediato. Administre naloxona, si tiene.**

**Abra las vías respiratorias y practique RCP hasta que llegue la ayuda.**

# Reduzca el riesgo de sufrir una sobredosis

## Use las tiras reactivas para detectar el fentanilo en todas las drogas.

La mayoría de las muertes a causa de sobredosis de opioides en el estado de Nueva York están relacionadas con los opioides sintéticos, como el fentanilo. Si no analiza las drogas que consume, su riesgo de tener una sobredosis aumenta.

El fentanilo es un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la heroína. Se lo puede encontrar en píldoras falsas y en la mayor parte de lo que se vende como heroína. También se lo puede encontrar en la cocaína, el crack, la metanfetamina y el MDMA. Descubra si las drogas que toma, fuma, inhala o se inyecta contienen fentanilo. No puede saber si una droga tiene fentanilo ni por su color ni por su sabor.

### Las tiras reactivas para detectar el fentanilo no son 100 % confiables.

No pueden indicar la cantidad de fentanilo que hay en su droga.

Puede sufrir una sobredosis incluso si la prueba indica que la droga no contiene fentanilo.

¿No ha usado opioides últimamente? El riesgo de sufrir una sobredosis es mayor, tanto si la droga contiene fentanilo como si no.

**Cantidad desigual:** cuanto mayor sea la cantidad de droga que analice, mayores serán las oportunidades de encontrar fentanilo. ¿Por qué? El fentanilo se mezcla con otras drogas de manera desigual.

## Cuídese

1. **¿No desea consumir fentanilo?** No consuma cualquier sustancia que tenga.
2. **Consuma una cantidad menor.** Un análisis de la dosis/inyección de su droga lo ayudará a comprobar qué tan potente es. Siempre puede consumir más, pero una vez que está en el cuerpo, no puede consumir menos.
3. **Intente no consumir cuando esté solo.** Esté cerca de otras personas que consuman naloxona y llame al 911 si es necesario. ¿Prefiere consumir cuando está solo? ¿No puede consumir cuando está cerca de otras personas?

**Llame a la línea directa Never Use Alone: 877-696-1996**

## Cómo:

### Obtener las tiras reactivas para detectar el fentanilo

<https://mattersnetwork.org/request-test-strips> 

<https://nextdistro.org> 

### Comuníquese con su organización local de servicios de jeringas a través de esta página:

<https://nextdistro.org/nysep> 

### Obtener naloxona

[health.ny.gov/overdose](https://health.ny.gov/overdose)   
1-800-692-8528

### Responda ante una sobredosis de opioides

[health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid\\_overdose\\_prevention/overdose\\_facts](https://health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/overdose_facts) 

Esta publicación se financió con fondos provenientes del Acuerdo de Cooperación número NU17CE010215 de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Su contenido es responsabilidad únicamente de los autores y no representa necesariamente la opinión oficial de los CDC.



Department  
of Health