



« Grippe aviaire » H5N1

Recommandations pour les exploitants/producteurs laitiers

Situation : Depuis 2022, l'influenza aviaire A hautement pathogène (highly pathogenic avian influenza, HPAI) est détectée aux États-Unis sur la volaille, les oiseaux sauvages, les félins, d'autres petits mammifères et le bétail comme les vaches laitières. Ce virus est également appelé H5N1 ou « grippe aviaire ».

En 2024, plusieurs infections au virus H5N1 ont été détectées aux É.-U. chez des personnes travaillant avec du lait cru provenant de vaches infectées. Les exploitants laitiers peuvent aider à freiner la propagation de ce virus en mettant en place des mesures qui permettent de réduire le risque d'infection parmi leurs travailleurs.

Risque pour les humains : L'expression « l'influenza aviaire hautement pathogène » signifie que le virus cause des maladies graves chez les oiseaux. Bien que le virus puisse potentiellement causer des maladies graves aussi chez les humains, cela n'a pas été observé aux États-Unis pendant l'éclosion actuelle. Le virus H5N1 peut être transmis par le lait ou les produits laitiers non pasteurisés et les objets contaminés par les excréments, la litière ou d'autres sécrétions d'oiseaux ou autres animaux infectés.

Les recommandations comprennent : La protection des ouvriers agricoles et des animaux, le suivi des maladies et la mise en place de mesures agricoles à suivre si un animal tombe malade.

1. Assurez-vous de disposer de suffisamment d'équipement de protection individuelle (personal protective equipment, PPE) ou de connaître une source fiable où vous en procurer.

- Revoyez [la liste des articles des PPE recommandés](#).



www.cdc.gov/bird-flu/prevention/worker-protection-ppe.html




- En cas de questions concernant le PPE, communiquez avec votre [ministère de la Santé local](#).



www.health.ny.gov/contact/contact_information/

- Les ouvriers agricoles doivent changer leurs vêtements après avoir été en contact avec des animaux malades.

2. Assurez-vous que les ouvriers portent le PPE adéquat lorsqu'ils doivent travailler avec des animaux qui sont potentiellement infectés du virus H5N1 – et lorsqu'ils travaillent avec la matière provenant de ces animaux comme le lait cru. Le PPE comprend les articles suivants :



3. Formez les ouvriers agricoles sur l'utilisation des PPE et les autres mesures de protection.


- Évitez de vous toucher le visage, les yeux, le nez ou la bouche.
- Lavez-vous souvent les mains.
- Ne consommez pas de lait cru ni de produits fabriqués à partir de lait cru. Il est dangereux de consommer du lait cru.
- Changez vos vêtements, jetez le PPE jetable et désinfectez le PPE réutilisable après un contact avec des animaux malades.
- Obtenez votre vaccin annuel antigrippal. Il ne vous protégera pas contre le H5N1, mais il peut aider à empêcher le virus de développer la capacité de passer entre les humains, comme c'est le cas pour la grippe saisonnière.
- Évitez de manger, de boire, de fumer, de vapoter ou de faire toute autre activité impliquant de porter les mains à la bouche sans vous les être lavées. Prenez vos pauses dans un endroit propre à l'écart des zones de travail/d'animaux.

4. Faites preuve de biosûreté.

- Rehaussez les pratiques en matière de biosûreté pour empêcher les maladies d'atteindre l'exploitation agricole et de s'y propager.
- En cas de questions, communiquez avec votre vétérinaire, le vétérinaire régional du ministère de l'Agriculture et des marchés (Department of Agriculture and Markets, AGM) et/ou le vétérinaire local responsable (Area Veterinarian In Charge) du ministère de l'Agriculture des É.-U. (United States Department of Agriculture, USDA).
- Limitez les contacts avec les animaux malades au personnel essentiel uniquement.

5. Avisez votre ministère de la Santé local si un ouvrier agricole est exposé à un animal malade. Contactez-le également si tout ouvrier agricole ayant été en contact avec un animal infecté développe des symptômes.

- Les signes et symptômes d'une infection au virus H5N1 chez les humains peuvent comprendre : Rougeur et irritation oculaire/ larmolements, toux, mal de gorge, écoulement ou congestion nasal(e), douleurs musculaires ou courbatures, maux de tête, fatigue, difficulté à respirer, fièvre et diarrhée.



Si vous souhaitez des mises à jour situationnelles, des réponses aux questions de la FAQ et des recommandations de sécurité :

[Page Web](#) des services d'inspection de la santé des animaux et des plantes (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) du ministère de l'Agriculture (USDA)



www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/avian/avian-influenza/hpai-detections/livestock

Si vous souhaitez rester informé sur les directives :

[Site Web](#) du ministère de la Santé de l'État de New York (New York State Department of Health)



www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/avian/



Department
of Health

Cornell Cooperative Extension
Central New York Dairy, Livestock and Field Crops